AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN **TECHNIQUE** DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS **AGRICOLES**

DLP 28-5-73 530247

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

EDITION DE LA STATION RHONE-ALPES

(AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)

69426 LYON CEDEX 3 55 Rue Mazenod Tél. 60-95-87 (Postes 426 et 427)

ABONNEMENT ANNUEL: 30 F

C. C. P. LYON 9431-17 Régisseur Avances et Recettes D. D. A. 55, Rue Mazenod - 69 - LYON - 3°

Lisez sur l'enveloppe de ce bulletin le numéro de votre région

ter supplément au bulletin Nº 152 de Mai 1973

21 Mai 1973

page 17

VIGNE

MILDIOU - BLACK-ROT - Les traitements devront être renouvelés dès réception même en 1 absence de fortes précipitations en raison de la croissance très rapide des organes.

VERS DE LA GRAPPE .. Aucun traitement n'est encore nécessaire.

CONCOURS DE DETECTION

Ce concours concerno les maladies suivantes:

- Mildiou, black-rot, brenner, botrytis (précoce) sur vigne

- Mildiou sur pomme de terre

- Mildiou et alternaria sur tomate.

Toute personne, abonnée ou non, qui aura fait parvenir un échantillon reconnu porteur de taches primaires d'une de ces maladies recevra gratuitement ce bulletin et la revue "Phytoma" pendant la durée de l'année 1974, dans les limites suivantes:

- Premier envoi de sa commune dans les zones d'appellation en ce qui concerne la vigne.
- Premier envoi de chaque région naturelle de notre nomenclature dans tous les autres cas. Chaque envoi devra comporter les précisions suivantes:
- nom, prénom et adresse codée complète de la personne ayant recueilli l'échantillon'
- variété ou cépage, date et lieu (commune et lieu-dit) de la récolte Tous les envois seront adressés:

Station d'Avertissements Agricoles Rhone-Alpes 55 rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES SUR POMMIER - POIRIER - PECHER - Il est encore trop tôt pour juger de l'importance des attaques primaires, notamment dans le nord-est de la Circonscription, plus tardif et relativement moins arrosé cette année, aussi la protection devra-t-elle être maintenue à une cadence d'autant plus rapide que la croissance du végétal est plus active.

ANTHRACNOSE DU CERISIER - Le premier traitement sera renouvelé dans la mesure où l'approche de la récolte le permettra.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER en pépinières - Des éclosions de papillons sont observées dans toute la zone de culture du pêcher et l'activité de l'insecte a été favorisée par la dernière période chaude. En conséquence, un premier traitement spécifique devra être appliqué entre le 24 et le 27 Mai.

L'Ingénieur d'Agronomie chargé des Avertissements agricoles P.LATARD

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie Chef de la Circonscription A.PITHIOUD

Imprimerie de Ma Station Rhône-Alpes Directeur-gérant: L.BOUYX